


در نتیجه  $MF \times MF' = 14$  و  $MF + MF' = 8$  با فرض  $S = 8$  و  $P = 14$  می‌توان نوشت

$$x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + 14 = 0 \Rightarrow x = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \times 14}}{2} = 4 \pm \sqrt{2}$$

بنابراین فاصله  $M$  از یک کانون  $4 + \sqrt{2}$  و از کانون دیگر  $4 - \sqrt{2}$  است، پس فاصله  $M$  تا کانون نزدیک‌تر  $4 - \sqrt{2}$  است.



سهمی  $y^2 + ay + bx + 1 = 0$  افقی است، پس عرض رأس سهمی با عرض کانون آن برابر و مساوی  $-2$  است. معادله سهمی را استاندارد می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (y + \frac{a}{2})^2 - \frac{a^2}{4} &= -bx - 1 \Rightarrow (y + \frac{a}{2})^2 = -bx - 1 + \frac{a^2}{4} \\ \text{عرض رأس سهمی } -2 \text{ است} &\rightarrow -\frac{a}{2} = -2 \Rightarrow a = 4 \end{aligned}$$

در نتیجه معادله سهمی به صورت زیر درمی‌آید:

$$(y + 2)^2 = -bx + 3 \Rightarrow (y + 2)^2 = -b(x - \frac{3}{b})$$

با فرض  $b < 0$  نتیجه می‌گیریم دهانه سهمی رو به راست است و رأس آن  $S(\alpha, \beta) = (\frac{3}{b}, -2)$  است و  $4a = -b$ ، پس  $a = \frac{-b}{4}$  مختصات کانون این

سهمی به صورت مقابل است:  $F(a + \alpha, \beta) = (-\frac{b}{4} + \frac{3}{b}, -2) = (-\frac{1}{4}, -2)$

بنابراین

$$\begin{aligned} -\frac{b}{4} + \frac{3}{b} &= -\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{-b^2 + 12}{4b} = -\frac{1}{4} \Rightarrow 4b^2 - 4b - 48 = 0 \\ b^2 - b - 12 &= 0 \Rightarrow (b - 4)(b + 3) = 0 \Rightarrow b = 4 \text{ یا } b = -3 \end{aligned}$$

پس کمترین مقدار  $b$  برابر  $-3$  است.

ابتدا ماتریس  $A^2$  و سپس درایه‌های سطر اول ماتریس  $A^3$  را پیدا می‌کنیم.

$$\begin{aligned} A^2 &= A \times A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 24 \\ -2 & -3 & -7 \\ 4 & 1 & 9 \end{bmatrix} \\ A^3 &= A^2 \times A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 24 \\ -2 & -3 & -7 \\ 4 & 1 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 6 & 86 \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix} \end{aligned}$$

کوچک‌ترین دایره گذرا از دو نقطه  $A$  و  $B$  دایره‌ای به قطر  $AB$  است. پس مرکز دایره وسط  $AB$  و شعاع آن نصف طول پاره خط  $AB$  است:

$$O = \frac{A+B}{2} = (-1, 3), \quad R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{36+16}}{2} = \frac{\sqrt{52}}{2}$$

بنابراین معادله دایره به صورت زیر است:

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = \frac{52}{4} \xrightarrow{y=0} (x+1)^2 + 9 = \frac{52}{4} \Rightarrow (x+1)^2 = 4$$

$$x+1=2 \text{ یا } x+1=-2 \Rightarrow x=1 \text{ یا } x=-3$$

در شکل زیر دایره‌ای به مرکز  $O(\alpha, \beta)$  و گذرنده از نقطه  $A(1, -4)$  بر خط  $4x + 3y = 0$  و محور  $y$  مماس است. چون دایره بر محور  $y$  مماس است، پس طول مرکز آن برابر  $R$  است، بنابراین  $O(R, \beta)$  مرکز دایره

است و

$$R = \frac{|4R + 3\beta|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \Rightarrow 4R = 4R + 3\beta \Rightarrow \beta = -3R \Rightarrow O(R, -3R)$$

$$\Delta R = 4R + 3\beta, \quad -\Delta R = 4R + 3\beta$$

مرکز  $O$  در ناحیه چهارم مختصات قرار دارد، پس  $\beta$  باید منفی باشد:


$$-\Delta R = 4R + 3\beta \Rightarrow \beta = -3R \Rightarrow O(R, -3R)$$

بنابراین

$$OA = R \Rightarrow \sqrt{(R-1)^2 + (-3R+4)^2} = R$$

$$R^2 + 1 - 2R + 9R^2 + 16 - 24R + R^2 = R^2 \Rightarrow 9R^2 - 22R + 17 = 0$$

$$R = \frac{22 \pm \sqrt{26 \times 26 - 4 \times 9 \times 17}}{18} = \frac{13 \pm 4}{9} \Rightarrow R = \frac{17}{9}, R = 1$$



دایره به قطر  $FF'$  بیضی را در نقطه  $M$  قطع کرده است، پس

زاویه  $M$  محاطی و روبه‌رو به قطر  $FF'$  است، پس  $\hat{M} = 90^\circ$ ، یعنی مثلث  $MF'F$  قائم‌الزاویه است. از طرف دیگر بنا بر فرض،

$$2b = 2\sqrt{7} \Rightarrow b = \sqrt{7}, \quad 2a = 8 \Rightarrow a = 4$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 7 = 9 \Rightarrow c = 3$$

پس

$$\Delta MF'F: MF^2 + MF'^2 = FF'^2 = (2c)^2 = 36 \quad (1)$$

بنابراین

درضمن  $MF + MF' = 2a = 8$ ، پس

$$(MF + MF')^2 = 64 \Rightarrow MF^2 + MF'^2 + 2MF \times MF' = 64$$

$$\xrightarrow{\text{از (1)}} 36 + 2MF \times MF' = 64 \Rightarrow MF \times MF' = 14$$

۹ ۱ مطابق شکل مرکز دایره  $O(\alpha, R)$  است. در واقع عرض مرکز برابر شعاع دایره است. در ضمن فاصله مرکز  $O$  از دو خط  $3x-4y=0$  و  $y=0$  برابر است.

$$\text{فاصله } O \text{ تا } (3x-4y=0) = \text{فاصله } O \text{ تا } (y=0)$$

$$|R| = \frac{|3\alpha - 4R|}{\sqrt{9+16}} \Rightarrow R = \frac{|3\alpha - 4R|}{5} \Rightarrow \begin{cases} \Delta R = 3\alpha - 4R \\ \Delta R = -3\alpha + 4R \end{cases}$$

چون  $O$  در ناحیه اول دستگاه مختصات قرار دارد، پس باید  $\alpha$  مثبت باشد:  
 $\Delta R = 3\alpha - 4R \Rightarrow 3\alpha = 4R \Rightarrow \alpha = \frac{4}{3}R \Rightarrow O(\frac{4}{3}R, R)$   
 از طرف دیگر،


$$OA = R \Rightarrow \sqrt{(\frac{4}{3}R - R)^2 + (R - R)^2} = R$$

توان دو

$$\Rightarrow 9R^2 + 9 - 18R + R^2 + 4 - 4R = R^2 \Rightarrow 9R^2 - 22R + 13 = 0$$

$$R = \frac{22 \pm \sqrt{22^2 - 4 \times 9 \times 13}}{2 \times 9} = \frac{11 \pm \sqrt{11 \times 11 - 9 \times 13}}{9}$$

$$= \frac{11 \pm \sqrt{121 - 117}}{9} = \frac{11 \pm 2}{9} \Rightarrow R = \frac{13}{9}, R = 1$$



۱۰ ۲ بنابر فرض سؤال،

$$2b = 4\sqrt{6} \Rightarrow b = 2\sqrt{6}, \quad 2a = 14 \Rightarrow a = 7$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 24 = 25 \Rightarrow c = 5$$


پس نقطه  $O$  مرکز بیضی و در نتیجه مرکز دایره به قطر  $AA'$  است، پس

$$OM = OA = 7$$

$$\Delta OMF: MF^2 = OM^2 - OF^2 \Rightarrow MF^2 = a^2 - c^2 = b^2 \Rightarrow MF = b$$

$$\Delta AMF: AM^2 = MF^2 + AF^2 \xrightarrow{\frac{AF=a-c}{MF=b}} AM^2 = b^2 + (a-c)^2$$

$$AM^2 = (2\sqrt{6})^2 + (7-5)^2 = 24 + 4 = 28 \Rightarrow AM = 2\sqrt{7}$$



۱۱ ۱ معادله سهمی را استاندارد می‌کنیم:  $(y + \frac{a}{2})^2 = -bx + 9 + \frac{a^2}{4}$

$$-\frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = -2$$

چون  $y=1$  محور تقارن سهمی است، پس

پس معادله سهمی به صورت زیر در می‌آید:

$$(y-1)^2 = -bx + 10 \Rightarrow (y-1)^2 = -b(x - \frac{10}{b})$$

۶ ۳ با فرض  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$  نتیجه می‌گیریم

$$B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

و با فرض  $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$  نتیجه می‌گیریم  $C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

اکنون طرفین رابطه ماتریسی داده شده را از چپ در  $B^{-1}$  و از راست در  $C^{-1}$  ضرب می‌کنیم:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow X = B^{-1} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} C^{-1}$$

$$X = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 20 & -24 \\ -16 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

۷ ۳ حاصل دترمینان را برحسب سطر اول بسط می‌دهیم:

$$\begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 1 \\ 3 & 2 & 3-x \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -4(-1)^2 \begin{vmatrix} 2-x & 1 \\ 2 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$+ 1(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3-x \end{vmatrix} + 1(-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 2-x \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$-4(6+x^2-5x-2) - 1(3-x-3) + 1(2-6+3x) = 0$$

$$-16-4x^2+20x+x-4+3x = 0$$

$$-4x^2+24x-20 = 0 \xrightarrow{\text{تقسیم بر } -4} x^2-6x+5 = 0$$

$$(x-1)(x-5) = 0 \Rightarrow x=1 \text{ یا } x=5$$

۸ ۴ بنابر فرض سؤال وتر  $AB$  به طول  $2\sqrt{21}$  است، پس  $AH = \sqrt{21}$ . با به دست آوردن  $OH$  شعاع  $OA$  را پیدا می‌کنیم:

$$OH = \frac{|5+36-15|}{\sqrt{25+144}} = \frac{26}{13} = 2$$


$$\Delta OAH: OA^2 = OH^2 + AH^2 = 4 + 21 = 25 \Rightarrow OA = 5 \Rightarrow R = 5$$

معادله دایره:  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 25$

اکنون نقاط برخورد این دایره با محور  $x$  را تعیین می‌کنیم:

$$y=0 \Rightarrow (x-1)^2 + 9 = 25 \Rightarrow (x-1)^2 = 16 \Rightarrow \begin{cases} x-1=4 \Rightarrow x=5 \\ x-1=-4 \Rightarrow x=-3 \end{cases}$$

نقاط تلاقی دایره با محور  $x$  نقطه‌های  $M(5, 0)$  و  $N(-3, 0)$  است و فاصله این دو نقطه مساوی  $MN=8$  است.



پس این سهمی افقی است و رأس آن  $S(h, k) = (\frac{1}{b}, 1)$  است و چون علامت

$b > 0$ ، مشخص نیست دهانه سهمی یا به چپ یا به راست باز می‌شود. اگر  $b > 0$ ،

آن‌گاه دهانه سهمی به چپ باز می‌شود  $4a = b$ ، پس  $a = \frac{b}{4}$  و

$$\text{معادله خط هادی: } x = a + h \xrightarrow{x = \frac{1}{b}} \frac{1}{b} = \frac{b}{4} + \frac{1}{b}$$

$$\xrightarrow{\text{ضرب می‌کنیم}} 4b \rightarrow 13b = b^2 + 4 \Rightarrow b^2 - 13b + 4 = 0$$

$$(b-8)(b-5) = 0 \Rightarrow b = 8, b = 5$$

چون این مقادیر در گزینه (۱) وجود دارند، پس لزومی به بررسی حالت  $b < 0$  نیست.

**۱۲ ۲** ابتدا ماتریس  $A^2$  را به دست می‌آوریم:

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

اکنون فقط درایه‌های سطر اول ماتریس  $A^4$  را پیدا می‌کنیم:

$$A^4 = A^2 \times A^2 = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

**۱۳ ۲** طرفین تساوی  $AX = A^{-1}$  را از سمت چپ در  $A^{-1}$  ضرب

می‌کنیم تا ماتریس  $X$  به دست آید:

$$AX = A^{-1} \Rightarrow X = (A^{-1})^2 \quad (1) \quad \text{از طرف دیگر،}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{(1)} X = (A^{-1})^2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & -14 \\ -56 & 25 \end{bmatrix}$$

**۱۴ ۳** دترمینان را بر حسب سطر اول بسط می‌دهیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & x+5 \\ x-1 & 6 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 1(-1)^2 \begin{vmatrix} 4 & x+5 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} + 2(-1)^3 \begin{vmatrix} -2 & x+5 \\ x-1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$+ 3(-1)^4 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ x-1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-4 - 6x - 30) + (-2)(2 - x^2 - 4x + 5)$$

$$+ 3(-12 - 4x + 4) = 0 \Rightarrow -6x - 34 + 2x^2 + 8x - 14 - 24 - 12x = 0$$

$$2x^2 - 10x - 72 = 0 \xrightarrow{\div 2} x^2 - 5x - 36 = 0 \Rightarrow (x-9)(x+4) = 0$$

$$x = 9, x = -4$$